

# Recomanacions de neteja i desinfecció d'instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus

## Mesures de contenció de la transmissió de COVID-19

ACSA 19-03-2020



Nota: Aquestes recomanacions es basen en el coneixement actual sobre el coronavirus SARS-CoV-2 i l'evidència provinent d'estudis sobre altres coronavirus publicat en l'Informe tècnic ECDC "Guia provisional per a la neteja ambiental en instal·lacions no sanitàries exposades a SARS-CoV-2" 18 de febrer 2020. (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019>)



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut

Les mesures de contenció per evitar la propagació del COVID19 requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que les empreses tenen instaurats i que contemplen sales, equipaments, superfícies i estris així com també oficines, mobiliari, vestuaris i serveis higiènics com a mesura preventiva.

Cal fer especial èmfasi en la neteja del mobiliari i de les parts de les estructures que amb més freqüència contacten amb les mans (per exemple, dispositius per fitxar, pom de les portes, portes abatibles, baranes, etc.). Els vestuaris i zones comunes es netejaran amb més freqüència i com a mínim després de cada torn de treball tenint especial cura d'aquelles parts que s'hagin tocat amb les mans, com poden ser les portes de les taquilles, els bancs per seure.

La informació científica disponible indica que la neteja amb aigua i detergents i l'ús de productes desinfectants comuns hauria de ser suficient per a la neteja i desinfecció preventiva general.

Alguns ingredients actius, per exemple **hipoclorit de sodi (contingut en el lleixiu domèstic) i l'etanol es consideren eficaços**.

### **Agents antimicrobians eficaços contra diferents coronavirus.**

<b>Agent antimicrobià</b>	<b>Concentració</b>
Etanol	70%
Hipoclorit de sodi	0,1-0,5%
Povidona-iodada	10% (1% de iode)
Glutaraldehyd	2%
Isopropanol	50%
Clorur de benzalconi	0,05%
Clorit de sodi	0,23%
Formaldehid	0,7%

- **Es recomana l'ús d'hipoclorit de sodi a 0,1%** (dilució 1:50 si s'utilitza lleixiu domèstic en una concentració inicial de 5%) després de la neteja amb un detergent neutre.
- Per a les superfícies que podrien ser danyades per l'hipoclorit de sodi, es necessita el 70% de concentració d'**etanol** per a la descontaminació després de la neteja amb un detergent neutre.
- La neteja i desinfecció ha de ser realitzada utilitzant **equip de protecció personal**.
- Quan s'utilitzen productes químics per a la neteja, és important **mantenir la instal·lació ventilada** (per exemple, l'obertura de les finestres) per tal de protegir la salut de el personal de neteja.
- **Totes les àrees que es toquen amb freqüència**, com totes les superfícies accessibles de parets i finestres, la tassa de l'inodor i superfícies de bany, **també s'han de netejar amb cura**.